





РЯД АКТИВНОСТИ МЕТАЛЛОВ / ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ РЯД НАПРЯЖЕНИЙ

Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb (H) Sb Bi Cu Hg Ag Pt Au

активность металлов уменьшается

РАСТВОРИМОСТЬ КИСЛОТ, СОЛЕЙ И ОСНОВАНИЙ В ВОДЕ

	H ⁺	Li ⁺	K ⁺	Na ⁺	NH ₄ ⁺	Ba ²⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Sr ²⁺	Al ³⁺	Cr ³⁺	Fe ²⁺	Fe ³⁺	Ni ²⁺	Co ²⁺	Mn ²⁺	Zn ²⁺	Ag ⁺	Hg ²⁺	Pb ²⁺	Sn ²⁺	Cu ²⁺	
OH ⁻		P	P	P	P	P	M	H	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	—	—	H	H	H
F ⁻	P	M	P	P	P	M	H	H	H	M	H	H	H	P	P	P	P	P	P	—	H	P	P
Cl ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	H	P	M	P	P
Br ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	H	M	M	P	P
I ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	P	?	P	P	P	P	P	H	H	H	M	?
S ²⁻	P	P	P	P	P	—	—	—	H	—	—	H	—	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
HS ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	?	H	H	?	?	?	?	?	?	?
SO ₃ ²⁻	P	P	P	P	P	H	H	M	H	?	—	H	?	H	H	?	?	M	H	H	H	?	?
HSO ₃ ⁻	P	?	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
SO ₄ ²⁻	P	P	P	P	P	H	M	P	H	P	P	P	P	P	P	P	P	P	M	—	H	P	P
HSO ₄ ⁻	P	P	P	P	P	?	?	?	—	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	H	?	?
NO ₃ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	—	P
NO ₂ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	P	M	?	?	?	M	?	?	?	?
PO ₄ ³⁻	P	H	P	P	—	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
HPO ₄ ²⁻	P	?	P	P	P	H	H	M	H	?	?	H	?	?	?	?	?	?	?	?	M	H	?
H ₂ PO ₄ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	P	?	?	?	?	P	P	P	?	—	?	?
CO ₃ ²⁻	P	P	P	P	P	H	H	H	H	?	?	H	—	H	H	H	H	H	H	H	H	?	H
HCO ₃ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	P	?	?	?	?	?	?	?	?	P	?	?
CH ₃ COO ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	—	P	P	—	P	P	P	P	P	P	P	P	—	P
SiO ₃ ²⁻	H	H	P	P	?	H	H	H	H	?	?	H	?	?	?	?	H	H	?	?	H	?	?

“P” – растворяется (> 1 г на 100 г H₂O)

“M” – мало растворяется (от 0,1 г до 1 г на 100 г H₂O)

“H” – не растворяется (меньше 0,01 г на 1000 г воды)

“-” – в водной среде разлагается

“?” – нет достоверных сведений о существовании соединений

Примечание: Электрохимический ряд напряжений металлов и таблица «Растворимость кислот, солей и оснований в воде» напечатаны из современного курса для поступающих в ВУЗы Н.Е. Кузьменко и др. «Начала химии» М., «Экзамен», 2000 (с. 241, форзац)



Задание 1

Превращение 1 моль формальдегида в метанол при взаимодействии с водородом сопровождается выделением 131,9 кДж теплоты, тогда как при образовании 1 моль воды из простых веществ выделяется 286 кДж.

- ✓ 1) Докажите, что при сгорании 1 моль метанола выделяется больше теплоты, чем при сгорании 1 моль формальдегида.
- ✓ 2) Рассчитайте тепловые эффекты сгорания метанола и формальдегида, учитывая, что при сгорании 1 моль графита выделяется 394 кДж, а при образовании 1 моль формальдегида из простых веществ выделяется 116 кДж.
- ✓ 3) Некоторое количество метанола сожгли в калориметрической бомбе, помещенной в калориметр с водой, масса которой 4 кг. Температура воды при этом увеличилась на 58°. Определите массу сожженного метанола, если постоянная калориметра равна $C_{const} = 1784,3 \frac{\text{Дж}}{\text{град}}$, а удельная теплоемкость воды составляет $C_p(H_2O) = 4182 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$.

Задание 2

В химической кинетике принято классифицировать реакции по величине общего порядка реакции.

Физический смысл порядка реакции – это число одновременно изменяющихся в процессе концентраций.

Порядок реакции может принимать значения от 0 до 3, включая дробные величины.

К реакциям нулевого порядка относят большинство гетерогенных реакций.

Скорость реакций *нулевого порядка* не зависит от концентраций веществ. Тогда $V_p = k_0$, где k_0 – константа скорости реакции нулевого порядка.

Скорость реакций *первого порядка* $A \rightarrow B$ прямо пропорциональна концентрации реагента.

Выражение для константы скорости первого порядка: $k_1 = \frac{1}{\tau} \ln \frac{C_0}{C_\tau}$; [мин^{-1}], где τ – время превращения,


C_0 – исходная концентрация реагента, C_τ – концентрация реагента, оставшегося в реакции по истечении времени τ

Скорость реакций *второго порядка* пропорциональна произведению концентраций A и B. Выражение для константы скорости второго порядка: $k_2 = \frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{C_\tau} - \frac{1}{C_0} \right)$; [$\frac{\text{л}}{\text{моль} \cdot \text{мин}}$].

Выражение константы скорости *третьего порядка* при равенстве начальных концентраций реагентов: $k_3 = \frac{1}{2\tau} \left(\frac{1}{C_\tau^2} - \frac{1}{C_0^2} \right)$; [$\frac{\text{л}^2}{\text{моль}^2 \cdot \text{мин}}$]

Время, за которое расходуется половина вещества A называют периодом полураспада (полупревращения) $\tau_{1/2}$.

Зависимость концентрации вещества A от времени



Задание

Реакцию целого порядка, описываемую уравнением $A \rightarrow B + D$, провели при двух температурах – при 10°C и 40°C – и получили следующие кинетические данные, представленные на графике.

Определите:

- а) порядок реакции;
- б) константы скорости реакции при 10°C и 40°C;
- в) температурный коэффициент реакции γ ;
- г) период полупревращения A при заданной исходной концентрации 4 моль/л при двух температурах;
- д) как изменилась скорость реакции при 40°C через четыре минуты после начала реакции по сравнению с исходной скоростью реакции?

Задание 3

Циановодород или синильная кислота HCN – яд, вызывающий кислородное голодание тканевого типа. Однако, это вещество очень востребовано в химической промышленности: при взаимодействии с карбонильными соединениями образует циангидрины, использующиеся в производстве замещенных и непредельных карбоновых кислот, является сырьем для получения акрилонитрила, метилметакрилата, химических волокон и пр.

В настоящий момент одним из распространенных методов получения циановодорода является метод Андрусова: прямой синтез из метана и аммиака в присутствии воздуха на платиновом катализаторе. Также HCN можно получить из аммиака и угарного газа в присутствии диоксида тория в качестве катализатора.

Известно, что молекулы циановодорода существует в виде двух таутомеров. Продолжение на обороте →

Анион CN^- образует прочные координационные связи с металлами, и это его свойство используется в реакции Эльснера при добыче золота для его отделения от пустой породы: золотосодержащую породу перемешивают в растворе цианида натрия, пропуская через этот раствор воздух. Элементарное золото растворяется вследствие образования комплекса, в котором координационное число металла-комплексобразователя равно двум.

Задание

- 1) Составьте структурные формулы таутомеров циановодорода. Какая геометрическая форма характерна для молекул этих изомеров? Каков характер связей и механизм их образования в этих молекулах? Какова степень окисления и валентность атома углерода в этих молекулах? Какой из изомеров, на ваш взгляд, является более устойчивым?
- 2) Составьте уравнения обоих описанных способов получения HCN.
- 3) Составьте уравнение реакции Эльснера. Какие типы химических связей присутствуют в полученном комплексном соединении?
- 4) Составьте уравнение взаимодействия циановодорода с ацетоном. Какие кислоты можно получить из образовавшегося циангидрина? Составьте схему превращения (или уравнения реакций) и дайте названия кислотам по номенклатуре ИЮПАК.

Задание 4

К веществу А – бесцветной жидкости с характерным запахом массой 138 г прибавили 813 г бромид фосфора (III). Образовавшееся жидкое (н.у.), но легкокипящее органическое вещество D отогнали из реакционной смеси и разделили на три равные части, второй продукт реакции (фосфористую кислоту) отбросили.

Первую часть вещества D нагрели с избытком спиртового раствора щелочи, в результате чего образовалось газообразное (н.у.) органическое вещество E. Весь газ E пропустили через разогретую до 1200 °C трубчатую печь, в результате чего получили смесь двух газов (н.у.) – водорода и органического газа G. Газ G пропустили при интенсивном перемешивании через нагретый до 55°C водный раствор смеси хлорида меди (I) с хлоридом аммония, в результате получили газообразное (н.у.) вещество L, которое отделили и тщательно высушили.

Вторую часть вещества D растворили в диэтиловом эфире и прибавили к полученному раствору 24 г магния (в виде стружки), по окончании растворения магния в реакционную смесь прибавили все количество вещества L, которое полностью прореагировало, в результате чего образовался и улетучился (н.у.) горючий газ Q с плотностью по водороду равной 15, а в колбе осталось полученное вещество M.

К оставшемуся полученному веществу M прибавили третью часть вещества D, в результате чего образовалось органическое вещество R. Вещество R при взаимодействии с бромом массой 160 г, растворенным в четыреххлористом углероде, привело к образованию органического вещества T.

Известно, что при сжигании на воздухе всего количества полученного газа E образуется 44,8 л (н.у.) углекислого газа и 36 мл воды.

Задание

1. Определите вещества D, E, G, L, Q и M, R, T и напишите уравнения реакций их получения, используя структурные формулы веществ.
2. Определите массу полученного вещества T. Приведите структурную формулу вещества T и назовите его и вещество R по номенклатуре ИЮПАК.

Задание 5

Бесцветное кристаллическое органическое вещество А с брутто-формулой $C_{13}H_{10}O_2$ внесли в реакционную колбу, добавили избыток раствора гидроксида натрия и прокипятили, в результате вещество А растворилось. После охлаждения в реакционную колбу прибавили по каплям соляную кислоту до слабокислой реакции по универсальной индикаторной бумаге, после чего прибавляли раствор гидрокарбоната натрия до прекращения выделения газа. Далее в реакционную колбу поместили барботер паровика и провели перегонку с водяным паром, дистиллят собрали и упарили, получив кристаллическое органическое ароматическое вещество Б с характерным запахом.

Остаток в реакционной колбе вновь подкислили соляной кислотой и охладили до примерно 4°C, в результате чего на дне колбы выпали бесцветные кристаллы вещества органического ароматического вещества Г, не имеющего запаха, которые отделили фильтрованием. При взаимодействии натриевого производного вещества Б с бромметаном в водной среде получается жидкое кислородсодержащее органическое вещество Д, с приятным запахом, плохо растворимое в воде, элементный анализ которого показал следующее содержание углерода и водорода: С - 77,78%; Н - 7,41%.

При нагревании вещества Г с оксидом фосфора (V) получают фосфорную кислоту и кристаллическое органическое вещество Е, имеющее молярную массу 226 г/моль.

Задание

1. Определите структурную формулу вещества А, назовите его по номенклатуре ИЮПАК.
2. Напишите уравнения всех описанных реакций, указав структурные формулы веществ Б, Г, Д, Е.
3. Предложите уравнение реакции синтеза вещества А из веществ Б и Е.

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА

Дано:

Задание 51

$$Q_{r1} = 131,9 \text{ кДж}$$



Решение:

$$Q_f^*(\text{H}_2\text{O}) = 286 \text{ кДж} \quad 1) \quad \text{H}_2\text{C}=\text{O} + \text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{OH} \quad Q_{r1} = 131,9 \text{ кДж}$$

$$Q_{r1} = Q_f(\text{CH}_3\text{OH}) - Q_f(\text{H}_2) - Q_f(\text{H}_2\text{CO})$$

 Q_f - теплота образования простых веществ равна 0 $\Rightarrow$

$$\Rightarrow Q_{r1} = Q_f(\text{CH}_3\text{OH}) - Q_f(\text{H}_2\text{CO}) \Rightarrow Q_f(\text{CH}_3\text{OH}) = Q_f(\text{H}_2\text{C}=\text{O}) + Q_{r1} \quad (1)$$


 Сравним Q_{r2} и Q_{r3} : $Q_{r2} \times Q_{r3}$

$$Q_f(\text{CO}_2) + Q_f(\text{H}_2\text{O}) - Q_f(\text{H}_2\text{CO}) \times Q_f(\text{CO}_2) + 2Q_f(\text{H}_2\text{O}) - Q_f(\text{CH}_3\text{OH})$$




$$Q_f(\text{H}_2\text{O}) - Q_f(\text{H}_2\text{CO}) \times Q_f(\text{H}_2\text{O}) - Q_f(\text{CH}_3\text{OH})$$

Подставим ур-ние (3):


$$- Q_f(\text{H}_2\text{CO}) \times Q_f(\text{H}_2\text{O}) - Q_f(\text{H}_2\text{CO}) - Q_{r1}$$

$$0 \times Q_f(\text{H}_2\text{O}) - Q_{r1}$$

$$0 \neq 0 < 256 \text{ кДж} - 131,9 \text{ кДж}$$

 $0 < 124,1 \text{ кДж} \Rightarrow$ При сгорании 1 моля CH_3OH выделяется больше тепла, чем при сгорании 1 моля $\text{H}_2\text{C}=\text{O}$.


$$Q_{r3} = Q_{r1} + Q_f(\text{H}_2\text{C}=\text{O})$$



$$Q_{r3} = Q_f(\text{CO}_2) + 2Q_f(\text{H}_2\text{O}) - Q_f(\text{CH}_3\text{OH}) = 39$$

$$= Q_f(\text{CO}_2) + 2Q_f(\text{H}_2\text{O}) - Q_f(\text{H}_2\text{CO}) - Q_{r1} = 39 \text{ кДж} + 2 \cdot 286 \text{ кДж} - 116 \text{ кДж} - 131,9 \text{ кДж} = 718,1 \text{ кДж}$$

$$3) \cancel{Q_4 = m \cdot c \cdot \Delta T}. Q_1 = C_{\text{const}} \Delta T + C_p(\text{H}_2\text{O}) \cdot m_6 \cdot \Delta T = (C_{\text{const}} + C_p(\text{H}_2\text{O}) \cdot m_6) \Delta T$$

$$Q_2 = Q_{r3} \cdot V_1, \text{ кол-во молей сжатого } \text{CH}_3\text{OH}.$$

$$|Q_1| = |Q_2|$$




$$(m_6 \cdot C_p(\text{H}_2\text{O}) + C_{\text{const}}) \Delta T = Q_{r3} \cdot V_1$$

$$V_1 = \frac{(m_6 \cdot C_p(\text{H}_2\text{O}) + C_{\text{const}}) \Delta T}{Q_{r3}} = \frac{(4 \text{ кг} \cdot 4182 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} + 1784,3 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}) \cdot 58 \text{ К}}{718,1 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{моль}}} = 1,4952 \text{ моль}$$


$$m(\text{CH}_3\text{OH}) = V_1 \cdot \mu(\text{CH}_3\text{OH}) = 1,4952 \text{ моль} \cdot 32 \frac{\text{г}}{\text{моль}} \approx 47,85 \text{ г}$$

$$\text{Ответ: } 47,85 \text{ г}$$



Задача 3



Присутствуют донорно-акцепторные связи




Ацетон может енолизироваться.



2-гидрокси-2-метил-1-карбокси-пропан.

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА



3-гидрокси-бутановая кислота.

1) $\text{H}-\text{C}\equiv\text{N} \leftrightarrow \text{C}^{\oplus}\equiv\text{N}^{\ominus}-\text{H}$. Для них характерна линейная форма. В $\text{H}-\text{C}\equiv\text{N}$ в связи образуются благодаря образованию общей пары $\bar{e}$, а π -связи за счёт перекрывания п-орбиталей.

В $\text{C}^{\oplus}\equiv\text{N}^{\ominus}-\text{H}$ связь между C и N, образованы так же, как и в $\text{H}-\text{C}\equiv\text{N}$. Однако связь N-H в $\text{C}^{\oplus}\equiv\text{N}^{\ominus}-\text{H}$ образована по донорно-акцепторному механизму.

Мне кажется, что более устойчив $\text{C}^{\oplus}\equiv\text{N}^{\ominus}-\text{H}$ в $\text{H}-\text{C}\equiv\text{N}$, с.о. у C = +2, а валентн = 4. В $\text{C}^{\oplus}\equiv\text{N}^{\ominus}-\text{H}$, с.о. у C = +2, а валентн. = 3. Значит $\sqrt{4}$ так как карбонильной стабилизирован 3 связью с N.






$$1) \nu(\text{PBr}_3) = \frac{m(\text{PBr}_3)}{\mu(\text{PBr}_3)} = \frac{3132}{(80 \cdot 3 + 31)^{\frac{1}{2}}} = 3 \text{ см}^{-1}$$

Продукты реакции разделим на 3 части $\Rightarrow \nu(\text{PBr}_3)$ критно равно 3, то, вероятно все, что и A тоже критно. З.и.д.



$$\mu(A) = \frac{m(A)}{\nu(\text{PBr}_3)} = \frac{1382}{3 \text{ см}^{-1}} = 46 \text{ г.мол.} \Rightarrow A \text{ либо } \text{H}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}, \text{ либо } \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}.$$

Однако по химии вещества больше подходит $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.





A = $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ - это оно.



а не $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}=\text{CH}_2$, так как потом получаем реактив Коуля.




$$\text{Q} = \text{C}_2\text{H}_6; \mu(\text{C}_2\text{H}_6) = \rho(\text{H}_2) = 30 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$$



$$m(\text{T}) = \nu(\text{T}) \cdot \mu(\text{H}_2\text{C}=\underset{\text{Br}}{\text{CH}}-\underset{\text{Br}}{\text{C}}=\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_3) = \frac{\nu(\text{PBr}_3)}{3} \cdot \mu(\text{T}) =$$

$$= 1 \text{ моль} \cdot 240 \frac{\text{г}}{\text{моль}} = 240 \text{ г}$$



$$\nu(\text{H}_2\text{O}) = \frac{\rho(\text{H}_2\text{O}) \cdot V(\text{H}_2\text{O})}{\mu(\text{H}_2\text{O})} = 2 \text{ моль} \Rightarrow \nu(\text{H}) = 4 \text{ моль}$$

$$\nu(\text{C}) = \nu(\text{CO}_2) = \frac{44.8 \text{ г}}{22.4 \frac{\text{г}}{\text{моль}}} = \frac{V(\text{CO}_2)}{V_{\text{м}}} = 2 \text{ моль} \Rightarrow \nu(\text{C}); \nu(\text{H}) = 2:4 = 1:2 = 2$$

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА

Задача №5


$$1) \frac{\omega(C)}{\mu(C)} : \frac{\omega(H)}{\mu(H)} : \frac{1 - \omega(C) - \omega(H)}{\mu(O)} = 0,06482 : 0,0741 : 0,00925625 =$$

$= 7 : 8 : 1 \Rightarrow$ простейшая формула: C_7H_8O .




Вероятнее всего, $D =$ COc1ccccc1 $\Rightarrow B =$ Oc1ccccc1

2) По брутто формуле А, можно предположить, что




$A =$ O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2 - бензилбензоат.



Вероятно, ещё была реакция:



P_2O_5 - водоотнимающий реагент.



Задача №2

1) ~~Вид реакции~~ Пусть n - порядок реакции. $A \rightarrow B + D$.

Если $n=0$: То за одинаковые промежутки времени концентрация ~~должна~~ уменьшаться одинаково.

$$4 - 3,619 = 0,381; \quad 3,619 - 3,276 = 0,343; \quad 3,276 - 2,964 = 0,312 \quad \text{Это не так} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ реакция не первого порядка.

2) $K_1 = \frac{1}{t} \ln\left(\frac{C_0}{C_t}\right) \Rightarrow \ln(C_0) - \ln(C_t) = K_1 t \Rightarrow$ за одинаковые промежутки времени концентрация уменьшается на разность $\ln(C_0) - \ln(C_t)$

$$\ln(4) - \ln(3,619) \approx 0,1; \quad \ln(3,619) - \ln(3,276) \approx 0,1. \Rightarrow \text{реакция 1-го порядка.}$$

3) Аналогично можно доказать, что реакция не ~~первого~~ 2 и 3 порядка.

$$4) K_{10} = \frac{1}{2 \text{ мин}} \ln\left(\frac{4}{3,619}\right) \approx 0,05 \text{ мин}^{-1}$$

$$K_{40} = \frac{1}{2 \text{ мин}} \ln\left(\frac{4}{1,497}\right) \approx 0,4 \text{ мин}^{-1}$$

5) $v \sim k$

$$\frac{v_{40}}{v_{10}} \sim \frac{K_{40}}{K_{10}} = \gamma^{\frac{40-10}{10}} = \gamma^3 \Rightarrow \gamma^3 = \frac{0,4}{0,05} = 8 \Rightarrow \gamma = 2$$

6) ~~Темп~~ Термод. конств. превращения при 10°C :

$$K_{10} = \frac{1}{\frac{t}{2}(10^\circ\text{C})} \ln\left(\frac{C_0}{0,580}\right) = \frac{1}{\frac{t}{2}(10^\circ\text{C})} \ln(2) \Rightarrow \frac{1}{\frac{t}{2}(10^\circ\text{C})} = \frac{\ln(2)}{K_{10}} = \frac{\ln(2)}{0,05 \text{ мин}^{-1}}$$

































$$\approx 13,863 \text{ мин.}$$

~~Темп~~ Термод. конств. превращения при 40°C :










$$K_{40} = \frac{1}{\frac{t}{2}(40^\circ\text{C})} \ln\left(\frac{C_0}{0,580}\right) = \frac{1}{\frac{t}{2}(40^\circ\text{C})} \ln(2) \Rightarrow \frac{1}{\frac{t}{2}(40^\circ\text{C})} = \frac{\ln(2)}{K_{40}} = \frac{\ln(2)}{0,4 \text{ мин}^{-1}} \approx 1,733 \text{ мин.}$$

7) Реакция первого порядка $\Rightarrow v \sim C_t$.



$$\frac{v_4}{v_0} = \frac{C_4}{C_0} = \frac{0,808}{4} = 0,202 \Rightarrow \frac{1}{0,202} \approx 4,95 \Rightarrow \text{Скорость реакции уменьшилась в 4,95 раза.}$$




ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА



3-гидрокси-2-метилпропановая кислота





3-гидроксибутановая кислота



$$L_1 = \frac{1}{1 + K_1 L_0 + 1} = \frac{L_0}{K_1 L_0 + 1} = \frac{1}{K_1 + 1/L_0}$$

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА



92

